



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
कृषि अनुसंधान केन्द्र
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
बीकानेर - 334006
Phone 0151 2250018, 0151 2250570
Email: arsagrometbikaner@gmail.com



क्रमांक: एफ/एग्रो/एग्रोमेट./25
जिला:- बीकानेर

दिनांक: 16.09.2025

मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह
अवधि 16 सितम्बर 2025 से 20 सितम्बर 2025 तक

गत सप्ताह के मौसम की समीक्षा: इस दौरान अधिकतम तापमान 30.4 से 33.9 °C एवं न्यूनतम तापमान 21.8 से 24.3 °C के मध्य रहा। इस दौरान धीमी गति की हवायें चली एवं आपेक्षिक आर्द्रता 60 से 95% रही।

आगामी सप्ताह की मौसम भविष्यवाणी: भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली एवं राज्य मौसम केन्द्र, जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बीकानेर जिले में आगामी 5 दिनों के दौरान (16.09.2025 से 20.09.2025) 16.09.2025 से 18.09.2025 व 20.09.2025 को आंशिक बादल छाए रहने, 19.09.2025 को बादल छाए रहने, न्यूनतम तापमान 27.0-28.0°C और अधिकतम तापमान 36.0-37.0°C के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान दधिणी पश्चिमी और पश्चिमी दधिणी पश्चिमी दिशा से तेज गति की हवायें बहुत कम सापेक्ष आर्द्रता के साथ चलने की संभावना है।

मौसम कारक	दिनांक				
	16.09.2025	17.09.2025	18.09.2025	19.09.2025	20.09.2025
वर्षा) एम.एम.(0	0	0	0	0
आसमान में बादलों की स्थिति	आंशिक बादल	आंशिक बादल	आंशिक बादल	बादल	आंशिक बादल
अधिकतम तापमान (°C)	36	36	37	37	37
न्यूनतम तापमान (°C)	27	27	28	28	28
वायु दिशा	दधिणी पश्चिमी	दधिणी पश्चिमी	पश्चिमी दधिणी पश्चिमी	पश्चिमी दधिणी पश्चिमी	पश्चिमी दधिणी पश्चिमी
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत)	30	26	27	26	24
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत)	57	47	43	45	41
औसत वायु गति [कि./घण्टा]	16	16	14	16	17
वर्षा) एम.एम.(00.00				

कृषकों के लिए कृषि सलाह (Agro Advisory): गत सप्ताह की मौसम समीक्षा एवं इस सप्तक के लिए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को निम्न सलाह दी जाती है।

विशेष सलाह	कृषि सलाह		
बादलों के मौसम के दौरान पत्तियों पर रसायनों का छिड़काव न करें। पानी की एक-एक बूँद बचाएँ। मौजूदा और पूर्वानुमानित मौसम की स्थिति खड़ी खरीफ फसलों में रोग और कीटों के हमले की संभावना बढ़ा सकती है। इसलिए, फसलों और बागों में कीटों और बीमारियों के संक्रमण का पता लगाने के लिए नियमित रूप से खेतों की निगरानी करें। ग्वार और दलहन फसलों में रसचूसक कीटों (जैसिड, सफेद मक्खी, थ्रिप्स आदि) के नियंत्रण के लिए, एसिटामिप्रिड या थियामेथोक्साम का 3 ग्राम/10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।			
फसल	अवस्था	विवरण	कृषि सलाह
मूँगफली	शाखाएँ निकलना/पेगिंग	पीलेपन का उपचार व्याधि उपचार सिंचाई	मूँगफली की खड़ी फसल में पीलेपन के लक्षण दिखाई देने पर 0.5 प्रतिशत फेरस सल्फेट 0.1 प्रतिशत साइट्रिक अम्ल का छिड़काव करें। आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण मूँगफली की फसल में टिक्का रोग के प्रकोप की संभावना है। अतः किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए मेंकोजेब या क्लोरोथैलोनेल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से प्रयोग करें। मूँगफली की फसल में नमी का रखरखाव एक आवश्यक गतिविधि है।
सभी फसलें	प्रजनन	सिंचाई	शुष्क मौसम को देखते हुए दाना बनने की अवस्था में फसलों की सिंचाई करें।
उद्यानिकी		बाग लगाने एवं सिंचाई	किन्नो और बेर के नये बाग लगाने हेतु 6 मीटर x 6 मीटर की दूरी पर 1 मीटर x 1 मीटर x 1 मीटर आकार के गड्ढों की खुदाई कर 20 दिन खुला छोड़ दें। खजूर, किन्नो, संतरा व नीबू के बगीचे में नियमित अन्तराल पर सिंचाई करें।
पशुधन	खाद्य, एंव पोषक प्रबंधन	रोग	पंजीकृत पशु चिकित्सक की सलाह से प्रोटीन युक्त, उच्च पोषण वाली यूरिया - मोलसेज ईंटों का निर्माण करके पशुओं को खिलाएँ। मौसमी स्थिति को देखते हुए पलटू पशुओं में खुरपका-मुंह पका, लंगड़ी बुखार वी गलघोटू जैसी बिमारियों के प्रति टीका लगवाएँ।

सह-आचार्य एवं तकनीकी अधिकारी
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

क्षेत्रीय अनुसन्धान निदेशक एवं
नोडल ऑफिसर - ग्रामीण कृषि मौसम सेवा